

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 13/10/2011

## Dénomination du médicament

**MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet  
oxyde d'aluminium hydraté et hydroxyde de magnésium**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 10 jours de traitement, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet ?
3. Comment prendre MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet ?
6. Informations supplémentaires.

### **1. QU'EST-CE QUE MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### Classe pharmacothérapeutique

MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES contient de l'oxyde d'aluminium hydraté et de l'hydroxyde de magnésium. Ce médicament appartient à la famille des antiacides. Ils agissent en neutralisant l'acidité de l'estomac.

#### Indications thérapeutiques

Ce médicament est utilisé pour soulager les brûlures d'estomac et les remontées acides.  
Il est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 15 ans.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet ?**

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## Contre-indications

**Ne prenez jamais MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergique à l'une des substances actives (l'oxyde d'aluminium hydraté ou l'hydroxyde de magnésium) ou à l'un des autres composants contenus dans MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES. Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.
- Si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère).

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet :**

Avant de prendre MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES

Vous devez consulter votre médecin :

- si vos troubles sont associés à une perte de poids,
- si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,
- si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,
- si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale) ou si vous êtes dialysé, vous devez consulter votre médecin car MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES contient de l'aluminium et du magnésium. L'accumulation d'aluminium et de magnésium peut entraîner une maladie neurologique grave (encéphalopathie).
- si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 3,15 g de saccharose par sachet dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Interactions avec d'autres médicaments

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES interagit avec d'autres médicaments pris par voie orale. Ne prenez pas au même moment MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES et un autre médicament et respectez un délai d'au moins 2 heures entre leur prise.

Ce médicament contient des antiacides (oxyde d'aluminium hydraté et hydroxyde de magnésium). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Allaitement

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

## Sportifs

Sans objet.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

## Liste des excipients à effet notoire

**Informations importantes concernant certains composants de MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet :**

**Liste des excipients à effet notoire :** sorbitol, saccharose

## 3. COMMENT PRENDRE MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet ?

### Instructions pour un bon usage

Sans objet.

### Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Ce médicament est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 15 ans.

### Posologie

- La dose habituelle est de 1 à 2 sachets par prise au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides.
- Vous ne devez pas dépasser 6 prises par jour (soit 6 à 12 sachets par jour).

### Mode d'administration

- Malaxez soigneusement le sachet avant ouverture.
- Absorberez la suspension telle quelle sans la diluer.

### Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Symptômes et instructions en cas de surdosage

**Si vous avez pris plus de MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet que vous n'auriez dû :**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Le surdosage de magnésium par voie orale n'entraîne pas, en général, de réactions toxiques en cas de

fonctionnement normal du rein. L'intoxication au magnésium peut, toutefois, se développer en cas d'insuffisance rénale.

### Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

**Si vous oubliez de prendre MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet :**

Ne prenez pas double dose pour compenser celle que vous auriez oublié de prendre.

### Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de :

- troubles digestifs (diarrhées ou constipation),
- diminution du taux de phosphore dans le sang en cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### Date de péremption

Ne pas utiliser MAALOX MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES après la date de péremption mentionnée sur la boîte ou sur le sachet.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

### Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

### Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

**Que contient MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet ?**

#### La substance active est :

Oxyde d'aluminium hydraté.....	460 mg
équivalent à oxyde d'aluminium.....	230 mg
Hydroxyde de magnésium.....	400 mg

Pour un sachet de suspension buvable

#### Les autres composants sont :

Sirop de saccharose à 64 %, sorbitol à 70 pour cent (non cristallisable), gomme xanthane, gomme guar, chlorure de sodium, arôme fruits rouges.

## Forme pharmaceutique et contenu

### Qu'est-ce que MAUX D'ESTOMAC FRUITS ROUGES, suspension buvable en sachet et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable en sachet. Chaque boîte contient 10, 20, 30, 50 ou 60 sachets.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

## Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

### Titulaire

**SANOFI-AVENTIS FRANCE**  
1-13, BOULEVARD ROMAIN ROLLAND  
75014 PARIS

### Exploitant

**SANOFI-AVENTIS FRANCE**  
1-13, BOULEVARD ROMAIN ROLLAND  
75014 PARIS

### Fabricant

**Sanofi-aventis S.p.A.**  
Viale Europa, 11  
21040 Origgio (VA)  
Italie

## Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

## Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

## AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

## Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

## Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

## Autres

### CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.

Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

- évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,
- évitez les repas abondants et riches en graisses,
- évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,
- mangez lentement,
- variez votre alimentation,
- normalisez votre poids,
- évitez la pratique d'un effort important juste après le repas.

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.

N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS