

# NOTICE

Mis à jour : 11/05/1999

## Dénomination du médicament

**THIOPECTOL ADULTES, sirop**

Codéine/élixir de terpine

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE THIOPECTOL ADULTES, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE THIOPECTOL ADULTES, sirop ?
3. COMMENT PRENDRE THIOPECTOL ADULTES, sirop ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER THIOPECTOL ADULTES, sirop ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE THIOPECTOL ADULTES, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

## Classe pharmacothérapeutique

ANTITUSSIF  
(R. système respiratoire)

## Indications thérapeutiques

Ce médicament: contient un antitussif.  
Il est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'adulte.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE THIOPECTOL ADULTES, sirop ?**

## Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

## Contre-indications

**Ne prenez jamais THIOPECTOL ADULTES, sirop dans les cas suivants:**

- antécédent d'allergie à l'un des constituants,
- toux chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire.
- allaitement.

**Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE:**

- en association avec l'alcool.

Et sauf avis contraire de votre médecin, en cas de traitement par:

- les médicaments provoquant une réaction antabuse avec l'alcool,
- les dépresseurs du SNC,
- les **IMAO** non sélectifs,
- l'insuline,
- la metformine,
- les sulfamides hypoglycémiants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec THIOPECTOL ADULTES, sirop:**

### Mises en garde spéciales

**ATTENTION: LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MEDICAMENT EST DE 15,8° SOIT 1,9 g D'ALCOOL PAR CUILLERE A SOUPE.**

Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.

Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, demandez l'avis du médecin.

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui ont pu entraîner à doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées ([voir Posologie](#)).

### Précautions d'emploi

PREVENEZ VOTRE MEDECIN en cas de maladie au long cours du foie.

Il conviendra de ne pas associer un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique). En cas de diabète ou de régime hypoglucidique (pauvre en sucre), tenir compte de la teneur en saccharose (10,3 g par cuillère à soupe).

EN CAS DE DOUTE N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

## Interactions avec d'autres médicaments

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec

l'alcool et avec les médicaments (disulfirame, certains antibactériens, certains antifongiques) entraînant une réaction antabuse avec l'alcool (chaleur, rougeur, vomissement, palpitations), les dépresseurs du système nerveux central (antidépresseurs, antihistaminiques, anxiolytiques, neuroleptiques, morphiniques, certains antihypertenseurs), les médicaments destinés au traitement du diabète (chlorpropamide, glibenclamide, glipizide, insuline, metformine, sulfamides hypoglycémisants), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament, contient un antitussif la codéine. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif.

Ne les associer pas, afin de ne pas dépasser les posologies maximales conseillées ([voir Posologie et Mode d'administration](#)).

### **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

### **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

#### **Grossesse et allaitement**

##### **Grossesse**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

##### **Allaitement:**

Ce médicament passe dans le lait maternel.

De trop fortes doses de codéine administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. En cas d'allaitement, la prise de ce médicament est contre-indiquée.

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Sportifs**

#### **Sportifs**

Attention, cette spécialité contient une substance pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopages.

### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

L'attention est appelée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les possibilités de somnolence attachée à l'usage de ce médicament. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.

Il est préférable de commencer ce traitement le soir.

### **Liste des excipients à effet notable**

Liste des excipients à effet notable: Alcool, saccharose.

## **3. COMMENT PRENDRE THIOPECTOL ADULTES, sirop ?**

### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

## **Posologie**

RESERVE A L'ADULTE.

En l'absence d'efficacité, ne pas augmenter les doses au-delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais consulter un médecin.

La posologie usuelle est de:

Chez l'adulte: 1 à 2 cuillères à soupe, à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 8 cuillères à soupe par jour.

Chez les sujets âgés ou en cas d'insuffisance hépatique, diminuez de moitié les doses conseillées chez l'adulte.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE:

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

## **Mode d'administration**

Voie orale.

## **Fréquence d'administration**

Les prises doivent être espacées de 6 heures au minimum.

## **Durée du traitement**

Le traitement doit être court (quelques jours).

## **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

**Si vous avez pris plus de THIOPECTOL ADULTES, sirop que vous n'auriez dû:**

En cas de surdosage, CONSULTER un médecin.

## **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

## **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, THIOPECTOL ADULTES, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de: constipation, somnolence, vertige, nausées, vomissements:

Rarement: gêne respiratoire, réactions cutanées.

En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées: possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER THIOPECTOL ADULTES, sirop ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser THIOPECTOL ADULTES, sirop après la date de péremption mentionnée sur la boîte, le flacon.

### **Conditions de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

## Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient THIOPECTOL ADULTES, sirop ?

**Les substances actives sont:**

Codéine .....	0,08 g
Elixir de terpine* .....	33,00 g

Pour 100 g de sirop.

**\*Composition de l'élixir de terpine:**

Alcoolat de garnis .....	11,62 g
Hydrate de terpine .....	0,16 g
Eau distillée de fleur d'oranger .....	2,38 g
Teinture de vanille .....	0,12 g
Teinture de safran .....	0,05 g
Solution de saccharose .....	18,43 g
Extrait fluide de capillaire .....	0,24 g

Pour 33 g d'élixir de terpine.

**Les autres composants sont:**

Extrait concentré pour sirop d'eucalyptus, alcool, sirop de baume de Tolu, solution de saccharose.

Titre alcoolique (V/V): 15,8°

Une cuillère à soupe (15 ml) contient 15 mg de codéine, 10,3 g de saccharose et 1,9 g d'éthanol.

### Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que THIOPECTOL ADULTES, sirop et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de sirop. Flacon de 150 ou 250 ml.

### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

#### Titulaire

**LABORATOIRES GIFRER BARBEZAT**

8-10, rue Paul Bert  
BP 165  
69151 Décines Cedex

#### Exploitant

**Laboratoires GIFRER BARBEZAT**

B.P. 165  
69151 DECINES CEDEX

#### Fabricant

**Laboratoires GIFRER BARBEZAT**

8-10, rue Paul Bert  
69150 DECINES CEDEX

### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.